

RKI-Empfehlung für die Wiederm Zulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen

Erkrankte				Ausscheider und Kontaktpersonen		Allgemeines	
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation	Erkrankung	Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen	Maßnahmen	Merkblatt/Infos
ja	← Klinische Genesung/ 3 neg. Stuhlproben ←	1-3 (-8) d	EHEC	→ Ja, 3 negative Stuhlproben →	→ Nein, wenn keine Symptome, jedoch 3 neg. Stuhlproben →	Händehygiene, Lebensmittelhygiene www.maerkischer-kreis.de	www.rki.de
nein	← Antibiotika Therapie und klinische Genesung ←	2-4 (1-8) d	Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis	→ Nein, solange keine Symptome →	→ Nein, wenn klinisch überwacht und Chemoprophylaxe durchgeführt wird →	Impfung laut STIKO; Rifampicin-Prophylaxe bei Kontaktpersonen	www.rki.de
Ja	← 24 h nach Beginn Antibiotikatherapie, sonst Abheilung Hautareale ←	2-10 d	Impetigo contagiosa (Borkenflechte)	→ entfällt →	→ nein →	Händehygiene, Wäschebehandlung bei 60°C.	www.rki.de
nein	← 5 d nach Beginn Antibiotikatherapie, sonst frühestens 3 Wochen nach Auftreten erster Symptome ←	7-14 (-20) d	Keuchhusten	→ entfällt →	→ Nein, wenn kein Husten →	Impfung laut STIKO, ggf. Gabe von Erythromycin bei Kontaktpersonen	www.rki.de
ja	← 3 mikroskopisch neg. Befunde von Sputum, Bronchialsekret oder Magensaft ←	Wochen bis viele Monate	Ansteckungsfähige Lungentuberkulose	→ entfällt →	→ Nein, wenn keine Symptome, Kontrollmaßnahmen sind zu dulden →	Nach Infektionsquelle suchen	www.rki.de
nein	← Nach Abklingen der klinischen Symptome, frühestens 5 d nach Ausbruch Exanthem ←	8-10 (-14) d	Masern	→ entfällt →	→ Nicht erforderlich bei: vollem Impfschutz oder postexpositioneller Schutzimpfung oder nach durchgemachter Krankheit (ärztliche Bestätigung erforderlich), sonst nach 14 d →	Impfung nach STIKO, Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kindern	www.rki.de



Cholera
Diphtherie
Virusbedingte hämorrhagische Fieber (VHF)
Paratyphus/Typhus
Pest
Poliomyelitis

Erkrankungen treten in Deutschland selten auf-
alle Maßnahmen erfolgen in Absprache mit
der Unteren Gesundheitsbehörde

Erkrankte			Erkrankung	Ausscheider und Kontaktpersonen		Allgemeines	
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation		Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen	Maßnahmen	Merkblatt/Infos
nein	← Nach Genesung	← 3-4 (--10) d	Meningokokken-Meningitis	→ entfällt →	Nein, wenn medikamentöse Prophylaxe durchgeführt wird;	Information und Beobachtung Kontaktpersonen STIKO beachten	www.rki.de
nein	← Frühestens 9 d nach Krankheitsbeginn; nach Abklingen der klinischen Symptome	← 16-18 (-25) d	Mumps	→ entfällt →	Nicht erforderlich bei Impfschutz, nach Riegelungsimpfung oder nach durchgemachter Krankheit; sonst nach 18 d	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
nein	← Keine Vorschriften! Empfehlung: 1 Woche nach Beginn des Exanths	← 14 – 21d	Röteln	→ entfällt →	Alle exponierten ungeimpften oder nur einmal geimpften Personen in Gemeinschaftseinrichtungen sollten möglichst frühzeitig eine MMR-Impfung erhalten.	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
Nein, aber schriftl. Erklärung der Sorgeberechtigten zur Behandlung	← Überlebende Milben dürfen nicht mehr in der Lage sein, einen neuen Krätzefall zu verursachen	← 2 – 6 Wochen	Scabies	→ entfällt →	Nein, wenn keine Symptome; Untersuchung aller Mitglieder der Wohngemeinschaft	Effektive Behandlung der Haut; 2x/d Wäsche- und Handtuchwechsel u. a. Bekämpfungsmaßnahmen	www.rki.de
nein	← 24 h nach Beginn der antibiotischen Behandlung; sonst nach Abklingen der Symptome	← 2 -4 d	Scharlach	→ entfällt →	Nicht erforderlich, nur Aufklärung über Erkrankung	Vermeiden des Kontaktes zu Erkrankten	www.rki.de
ja	← Nach klinischer Genesung und 3 negative Stuhlproben	← 12 – 96 h	Shigellose	→ Ja, 3 negative Stuhlproben →	Nein, wenn keine Symptome; in jedem Fall Nachweis 1 negative Stuhlprobe nach Beendigung der Inkubationszeit	Effektive Händehygiene	www.rki.de
nein	← Isolierung des Erkrankten; 2 Wochen nach Auftreten erster Symptome bzw. 1 Woche nach Auftreten des Ikterus	← 25-30 d (-50) d	Virushepatitis A oder E	→ entfällt →	4 Wochen; Nicht erforderlich nach durchgemachter Krankheit, bei Impfungsschutz bzw. 2 Wochen nach erfolgter Riegelungsimpfung	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. nicht genügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
nein	← 1 Woche nach Krankheitsbeginn bei unkompliziertem Verlauf	← 14-16 (-28) d	Windpocken	→ entfällt →	Nicht erforderlich bei: vollem Impfschutz oder postexpositioneller Schutzimpfung oder nach durchgemachter Krankheit (ärztliche Bestätigung erforderlich), sonst nach 16 d	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
Bei wiederholtem Befall von 4 Wochen	← Nach der ersten von zwei erforderlichen Behandlungen	← Kein IKZ	Kopflausbefall	→ entfällt →	Nein, aber Kontrolluntersuchungen ggf. Behandlung	Information zu Befall und zu effektiven Bekämpfungsmaßnahmen	www.rki.de

Erkrankte				Ausscheider und Kontaktpersonen			Allgemeines	
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation	Erkrankung	Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen	Maßnahmen	Merkblätter, Infos	
nein	Noroviren: 48 h nach erstem geformten Stuhl Sonstige: Abklingen der Symptome	Stunden - Tage	Nur für Kinder bis zum 6. Lebensjahr Viruseritiden	entfällt	Nein, wenn keine Symptome	Händehygiene	www.rki.de	
nein	Nach Abklingen des Durchfalls	Stunden - Tage	Nur für Kinder bis zum 6. Lebensjahr Bakterielle Enteritiden	entfällt	Nein, wenn keine Symptome	Händehygiene, Lebensmittelhygiene	www.rki.de	
Empfehlungen zur Wiederezulassung in Gemeinschaftseinrichtungen, die nicht in den RKI-Empfehlungen zur Wiederezulassung genannt sind (≥ 2 Erkrankungen Meldung an Untere Gesundheitsbehörde)								
Erkrankte				Ausscheider und Kontaktpersonen			Allgemeines	
ja	Empfehlung: Dauer der Ausscheidung 2 bis 3 Wochen		Ansteckende Bindehautentzündung Viral (Adenoviren)	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch	Augenkontakt meiden, Händehygiene	www.rki.de	
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: nach Abklingen der klinischen Symptome		Ansteckende Bindehautentzündung Eitrig bakteriell	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch	Augenkontakt melden, Händehygiene		
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung	3 - 35 Tage	Hand-Fuß-Mundkrankheit	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch	Händehygiene, meiden gemeinsames Besteck, Gläser etc	www.rki.de	
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Bleibende Entfieberung, Temp für 24 Std. am Stück nicht über 37,5°C		3-Tage Fieber	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch			
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung		Mundfäule	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch	Händehygiene, meiden gemeinsames Besteck, Gläser etc.		
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung		Pfeiffersches Drüsenfieber	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch			
nein	Keine Vorschriften! Urteil des behandelnden Arztes/Ärztin		Ringelröteln	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen Arztbesuch	Händehygiene		
Entscheidung der betroffenen Gemeinschaftseinrichtung..	Keine Vorschriften Absprache mit behandelndem Arzt		Trichophytie	entfällt	Ausschluss bei Auftreten von Symptomen; Entscheidung behandelnder Arzt			